

Žádanka o provedení předoperačního vyšetření

Vážená paní doktorko, vážený pane doktore, žádáme Vás o předoperační vyšetření pacienta:

bude na naše pracoviště přijat/a k plánovanému operačnímu zákroku dne:

s diagnózou:

Předoperační vyšetření proveďte laskavě v rozsahu vyznačeném níže*:

1. pacienti s klasifikací ASA 1 a ASA 2

Provádí praktický lékař pro dospělé, praktický lékař pro děti a dorost, pediatr nebo internista:

- anamnéza, medikace, fyzikální vyšetření
- krevní obraz, hemoglobin, hematokrit, INR, PTT, krevní skupina
- CRP, urea, kreatinin, glykémie, jaterní testy, ionty
- moč+bílkoviny+celkově, výtěr krk+nos-dle zvažení obv. lékaře
- RTG plic, EKG křivka
- INTERNÍ ZÁVĚR

2. pacienti s klasifikací ASA 3 a ASA 4

Provádí internista se specializovanou způsobilostí nebo pediatr se specializovanou způsobilostí:

- anamnéza, medikace, fyzikální vyšetření
- krevní obraz, hemoglobin, hematokrit, INR, PTT, krevní skupina
- CRP, urea, kreatinin, glykémie, jaterní testy, ionty
- RTG plic, EKG křivka
- speciální požadavky oddělení:

***) Požadavky na vyšetření jsou označeny zakroužkováním nebo vypsány písemně**

Platnost vyšetření:

- **ASA 1 – 1 měsíc** (normální zdravý jedinec)
- **ASA 2 – 2 týdny** (lehké celkové onemocnění či choroba bez omezení funkce a výkonnosti)
- **ASA 3 – čerstvé** (těžké celkové onemocnění či choroba s omezením funkce a výkonnosti)
- **ASA 4 – bude provedeno během hospitalizace** (těžký stav)

Léky ovlivňující krevní srážlivost je nutno vysadit 7 – 10 dnů před výkonem:

preparáty s acetylsalicylovou: Acylpyrin, Anopyrin, Apo-ASA, Aspirin, Aspro, Godasal, apod.

kombinované preparáty: Acylcoffin, Alka-Seltzer, Ring N, Thomapyrin, Upsarin C, Aspégic, apod.

Děkujeme za spolupráci

as. MUDr.Eduard Šťastný,Ph.D.